



Ohje sairaalaan tulevalle potilaalle

Kuvaus: Laboratoriokokeet, lääketauotus, ohjeita ja hoidonsuunnittelun yhteystiedot sairaalaan tulevalle potilaalle

Leikkausta varten pyydämme Teitä käymään alla mainituissa tutkimuksissa

Oma terveyskeskus, laboratorio tai
KYS laboratorio, näytteenotto

Verikokeita varten ei tarvitse olla ravinnotta.

Virtsakokeita varten olkaa 4 tuntia virtsaamatta.

Jos Teillä on käytössänne seuraavia lääkityksiä

- Marevan hoito – lääkitystauko ____ päivää ennen leikkausta
- Primaspan, Asperin, Disperin, Asasantin – tauko ____ päivää ennen leikkausta
- Diabeteslääkkeet ____ päivän tauko
- luontaistuotteet, esim. Omega, kalanmaksaöljy – tauko 2 viikkoa.

Ottakaa yhteyttä hoidonsuunnittelijaan, jos Teillä on

- sydämen keinoläppä ja/tai tahdistin
- tiedossa oleva verenvuotohäiriö
- laitettu sepelvaltimostentti viimeisen 3 kk aikana
- Plavix tai vastaava verenhiittymiseen vaikuttava lääkitys esim. Marevan, Primaspan, Xarelto, Pradaxa tai Klexane/Fragmin
- Kysyttävää lääkityksestä tai leikkauksesta

Terveydellisiä esteitä leikkaukselle ovat mm.

- yskä, nuha tai jokin tulehdus
- leikkausalueen iho ei ole terve
- muualla iholla on märkäisiä tulehduksia

Urologian hoidonsuunnittelu (virtsaelinkirurgia) p. 044-7175717

Gastrokirurgian hoidonsuunnittelu (vatsaelinkirurgia) p. 044-7175717

Plastiikkakirurgian hoidonsuunnittelu p. 044- 7113829

Hoidonsuunnittelun sihteeri p. 044-7172625