

## Potilasohje prick- eli ihopistotestiin tulevalle

Kuvaus: Ohjeita prick-testiin tulevalle potilaalle lääkkeiden käytöstä ja ihon hoidosta

Antihistamiinilääkkeiden käyttö heikentää ihon reaktiokykyä. Luotettavan testituloksen saamiseksi luettelossa mainittujen **antihistamiinien ja muiden antihistamiinivaikutusta omaavien lääkkeiden käyttö on lopetettava 5 vrk ennen testeihin tuloa.**

- **Aerinaze, Aerius, Alzyr, Atarax, Atosil**
- **Benadryl**
- **Cetimax, Cetirizin, Cirrus, Codesan comp**
- **Dasselta, Desloratadine, Diphenhydramine hydrochloride, Doxal, Duact**
- **Fexofenadine, Fexorin, Flynise**
- **Heinix, Histadin, Histec**
- **Kestine, Kestine Lyo, Kestox**
- **Levazyr, Levocetirizin, Levocetirizine, Loratadin**
- **Marzine**
- **Nefoxef, Nosedan, Norflex, Norgesic**
- **Peritol, Postafen**
- **Revitelle**
- **Stemetil**
- **Tavegyl, Telfast, Tuulix**
- **Xyzal**
- **Zyrtec**

Osalla psyykenlääkkeistä on myös antihistamiinivaikutusta, joten ne voivat vaikuttaa testitulosta heikentävästi. Näiden lääkkeiden käytön mahdollisesta keskeyttämisestä testejä varten on neuvoteltava lääkkeet määränneen lääkärin kanssa.

Mikäli käytössänne on **sisäinen kortisonitablettilääkitys yli 10 mg/vrk tai Xolair -lääke**, ottakaa yhteys kutsukirjeessä olevaan puhelinnumeroon.

**Hengitettäviä kortisonilääkkeitä voitte käyttää normaalisti.**

### Voiteiden käyttö

Testi tehdään kyynärvarren iholle tai joskus pienillä lapsilla selän iholle.

**Testin suorituspäivänä testialueen ihon on oltava puhdas ja rasvaton.** Kortisoni- tai muun lääkevoiteen käyttö testialueen iholle on lopetettava **2 vrk** ja perusvoiteen käyttö **1 vrk** ennen testauspäivää.

Ihotestauksia ei yleensä tehdä raskauden aikana.